

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
142	100 sauvages	42 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Orchis bouc	(<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. [1826])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce d'orchidée terrestre européenne qui est protégée. Elle a une forte odeur de bouc.</p>	 <p><small>Source : Xabi Rome-Hérault</small></p>
Ophrys abeille	(<i>Ophrys apifera</i> Huds. [1762])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce d'orchidée terrestre européenne qui est protégée. Elle ressemble à l'abdomen d'un insecte hyménoptère (bourdon, abeille...).</p>	 <p><small>Source : Xabi Rome-Hérault</small></p>
Coquelicot	(<i>Papaver rhoeas</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est le symbole de la biodiversité notamment pour la lutte contre les pesticides. C'est aussi un refuge : les abeilles la butinent, certains charançons viennent s'y loger et les oiseaux adorent ses graines.</p>	 <p><small>Source : Dominique Mollicone</small></p>
Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>	 <p><small>Source : Anneli Salo</small></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Rose trémière (*Alcea rosea* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Trèfle des sables (*Anthyllis vulneraria* L. [1753])
Bardane à petites têtes (*Arctium minus* (Hill) Bernh. [1800])
Armoise annuelle (*Artemisia annua* L. [1753])
Armoise commune (*Artemisia vulgaris* L. [1753])
Capillaire noir (*Asplenium adiantum-nigrum* L. [1753])
Capillaire des murailles (*Asplenium trichomanes* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divisa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Anthémis des teinturiers (*Cota tinctoria* (L.) J.Gay ex Guss. [1844])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Bleuet (*Cyanus segetum* Hill [1762])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Chiendent commun (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
(*Epilobium* L. [1753])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe petit-cyprés (*Euphorbia cyparissias* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque des moutons (*Festuca ovina* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
(*Galium* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobaea vulgaris* Gaertn. [1791])

Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne naine (*Medicago minima* (L.) L. [1754])
Mercuriale annuelle (*Mercurialis annua* L. [1753])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Ophrys abeille (*Ophrys apifera* Huds. [1762])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Coquelicot (*Papaver rhoeas* L. [1753])
Pariétaire des murs (*Parietaria judaica* L. [1756])
Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Poivre de muraille (*Sedum acre* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Silène à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique agreste (*Veronica agrestis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Rose trémière (*Alcea rosea* L. [1753])
Armérie des Alpes (*Armeria alpina* Willd. [1809])
Berbéis de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])

Ciste blanc (*Cistus albidus* L. [1753])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Late Cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Daphné bois-gentil (*Daphne mezereum* L. [1753])
Lotier hirsute (*Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. [1825])
Euphorbe des bois (*Euphorbia amygdaloides* L. [1753])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Fuchsia de Magellan (*Fuchsia magellanica* Lam. [1788])
Géranium à grosses racines (*Geranium macrorrhizum* L. [1753])
Benoîte des bois (*Geum sylvaticum* Pourr. [1788])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Hélianthème blanc (*Helianthemum apenninum* (L.) Mill. [1768])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Chèvrefeuille noir (*Lonicera nigra* L. [1753])
Chèvrefeuille des haies (*Lonicera xylosteum* L. [1753])
Gaura de Lindheimer (*Oenothera lindheimeri* (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch [2007])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Platane d'Espagne (*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh. [1770])
Peuplier noir d'Italie (*Populus nigra* var. *italica* Du Roi [1772])
Peuplier Tremble (*Populus tremula* L. [1753])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Saule blanc (*Salix alba* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
Thuja du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Mousse de feuille de cœur (*Tiarella cordifolia* L.)
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Viorne (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. [1888])
(*Viola* L. [1753])
Weigela florida (Weigela florida (Bunge) A.DC. [1839])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
95	85 sauvages	10 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Orchis bouc	(<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. [1826])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce d'orchidée terrestre européenne qui est protégée. Elle a une forte odeur de bouc.</p>	 <p>Source : Xabi Rome-Hérault</p>
Clématite des haies	(<i>Clematis vitalba</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau</p>	 <p>Source : J.F. Gaffard</p>
Ronce commune	(<i>Rubus fruticosus</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui permet de protéger les hérissons ou les nids d'oiseaux contre les prédateurs. C'est aussi une source de nourriture pour les pollinisateurs (papillons, abeilles...).</p>	 <p>Source : Dominicus Johannes Bergsma</p>
Carotte sauvage	(<i>Daucus carota</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nourriture pour les pollinisateurs et les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p>Source : Arn</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Bugle de Genève (*Ajuga genevensis* L. [1753])
Bugle rampante (*Ajuga reptans* L. [1753])
Vulpin des champs (*Alopecurus myosuroides* Huds. [1762])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Bardane à petites têtes (*Arctium minus* (Hill) Bernh. [1800])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. [1812])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Chiendent rampant (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisense* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Tournesol (*Helianthus annuus* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Houlque laineuse (*Holcus lanatus* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])

Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Rochel [1814])
(Orchidaceae)
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Oxalis dressé (Oxalis dillenii Jacq. [1794])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])
Plantain majeur (Plantago major L. [1753])
Pâturin annuel (Poa annua L. [1753])
Pâturin des prés (Poa pratensis L. [1753])
Pâturin commun (Poa trivialis L. [1753])
Fraisier de Duchesne (Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille rampante (Potentilla reptans L. [1753])
Coucou (Primula veris L. [1753])
Brunelle commune (Prunella vulgaris L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (Ranunculus parviflorus L. [1758])
Renoncule rampante (Ranunculus repens L. [1753])
Ronce commune (Rubus fruticosus L. [1753])
(Sagina L. [1753])
Orpin blanc (Sedum album L. [1753])
Rubéole des champs (Sherardia arvensis L. [1753])
Morelle noire (Solanum nigrum L. [1753])
Laiteron potager (Sonchus oleraceus L. [1753])
Pissenlit officinal (Taraxacum officinale F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (Torilis Adans. [1763])
Torilis des champs (Torilis arvensis (Huds.) Link [1821])
Torilis noueuse (Torilis nodosa (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle rampant (Trifolium repens L. [1753])
Verveine officinale (Verbena officinalis L. [1753])
Véronique des champs (Veronica arvensis L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia L. [1753])
Véronique de Perse (Veronica persica Poir. [1808])
Véronique à feuilles de serpolet (Veronica serpyllifolia L. [1753])
(Viola L. [1753])
Violette de rivin (Viola riviniana Rchb. [1823])
Vulpie faux Brome (Vulpia bromoides (L.) Gray [1821])

Espèces cultivées :

Erable argenté (Acer saccharinum L. [1753])
Arbre aux papillons (Buddleja davidii Franch. [1887])
Hibiscus (Hibiscus syriacus L. [1753])
Genévrier rampant (Juniperus horizontalis Moench)
Troène du Japon (Ligustrum japonicum Thunb. [1780])
Troène à feuilles ovales (Ligustrum ovalifolium Hassk. [1844])
Seringa commun (Philadelphus coron
[1785])
Laurier-cerise (Prunus laurocerasus L. [1753])
Sureau noir (Sambucus nigra L. [1753])

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021

Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
101	67 sauvages	34 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>	 <p><small>Source : Anneli Salo</small></p>
Mouron des oiseaux	(<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. [1789])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui a développé une résistance aux pesticides. C'est aussi la plante hôte de la chenille du papillon Brocatelle d'Or.</p>	 <p><small>Source : Hugo.arg</small></p>
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir au automne.</p>	 <p><small>Source : Joan-T</small></p>
Brunelle commune	(<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen qui favorise la pollinisation.</p>	 <p><small>Source : Ivar Leidus</small></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Alliaire (*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [1913])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse commune (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Liseron des haies (*Convolvulus sepium* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Picride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
(*Poaceae*)
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])

Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
Sénéçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Véronique agreste (*Veronica agrestis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [175])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Berbéis de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Mûrier à papier (*Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. [1799])
Arbres aux papillons (*Buddleja davidii* Franch. [1887])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Late Cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Délosperma (*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus [1927])
Deutzia (*Deutzia scabra* Thunb. [1781])
Fusain de Fortune (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. [1933])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Sédum remarquable (*Hylotelephium spectabile* (Bureau) H.Ohba [1977])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Genévrier rampant (*Juniperus horizontalis* Moench)
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Troène (*Ligustrum vulgare* L. [1753])
Tulipier de Virginie (*Liriodendron tulipifera* L. [1753])
Chèvrefeuille du Japon (*Lonicera japonica* Thunb. [1784])
Morus kagayamae Koidz (Morus kagayamae Koidz. [1915])
Photinia Lindley (Photinia Lindley [1821])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Tilleul argenté (*Tilia tomentosa* Moench [1785])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Weigela florida (Weigela florida (Bunge) A.DC. [1839])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 77	Dont 64 sauvages	Dont 13 cultivées
---	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Carotte sauvage	(Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p>Source : Arn</p>
Cardamine hérissée	(Cardamine hirsuta L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante hôte de la chenille du papillon Aurore.</p>	 <p>Source : Patrice78500</p>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p>Source : Joan-T</p>
Brunelle commune	(Prunella vulgaris L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen qui favorise la pollinisation.</p>	 <p>Source : Ivar Leidus</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantin lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantin majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
(*Sagina* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Saxifrage à trois doigts (*Saxifraga tridactylites* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])

Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (4 *Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])
Vulpie faux Brome (*Vulpia bromoides* (L.) Gray [1821])

Espèces cultivées :

Abélia à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Berbéris de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Late Cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Figuier commun (*Ficus carica* L. [1753])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
(*Rosa* L. [1753])
Symphorine à baies-de-corail (*Symphoricarpos orbiculatus* Moench [1794])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 108	Dont 76 sauvages	Dont 32 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Carotte sauvage (<i>Daucus carota L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 <small>Source : Arn</small>
Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 <small>Source : Anneli Salo</small>
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 <small>Source : Joan-T</small>
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 <small>Source : Ivar Leidus</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (Achillea millefolium L. [1753])
Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria L. [1753])
Ail maraîcher (Allium oleraceum L. [1753])
Brome stérile (Anisantha sterilis (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (Aphanes arvensis L. [1753])
Arabette de thalius (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (Bellis perennis L. [1753])
Brome mou (Bromus hordeaceus L. [1753])
Bryone dioïque (Bryonia dioica Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta L. [1753])
Laîche écartée (Carex divulsa Stokes [1787])
Céraiste commune (Cerastium fontanum Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill. [1799])
Calament glanduleux (Clinopodium nepeta (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (Convolvulus arvensis L. [1753])
Crépide bisannuelle (Crepis biennis L. [1753])
Crépide capillaire (Crepis capillaris (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (Crepis sancta (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (Crepis setosa Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L. [1753])
Carotte sauvage (Daucus carota L. [1753])
Digitaire commune (Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [1771])
Chiendent rampant (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Conyze du Canada (Erigeron canadensis L. [1753])
(Erigeron L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (Erodium cicutarium (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe petit-cyprés (Euphorbia cyparissias L. [1753])
(Festuca L. [1753])
Gaillet gratteron (Galium aparine L. [1753])
Gaillet commun (Galium mollugo L. [1753])
Géranium à feuilles molles (Geranium molle L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (Geranium rotundifolium L. [1753])
Benoîte commune (Geum urbanum L. [1753])
Lierre grimpant (Hedera helix L. [1753])
Orge sauvage (Hordeum murinum L. [1753])
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata L. [1753])
Knautie des champs (Knautia arvensis (L.) Coult. [1828])
Lamier amplexicaule (Lamium amplexicaule L. [1753])
Lamier pourpre (Lamium purpureum L. [1753])
Ivraie vivace (Lolium perenne L. [1753])
Mouron rouge (Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Luzerne tachetée (Medicago arabica (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (Medicago lupulina L. [1753])
Mercuriale annuelle (Mercurialis annua L. [1753])
Muscari à grappes (Muscari neglectum Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Rochel [1814])
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Oxalis dressé (Oxalis dillenii Jacq. [1794])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])

Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Orpin acre (*Sedum acre* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Cognassier du Japon (*chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Cyprès de l'Arizona (*Cupressus arizonica* Greene [1882])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Elaeagnus submacrophylla Servett (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Forsythia Vahl (*forsythia Vahl* [1804])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum japonicum* Thunb. [1780])
Troène (*Ligustrum vulgare* L. [1753])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Populus lasiocarpa (*Populus lasiocarpa* Oliv. [1890])
Prunier myrobolan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Pêcher (*Prunus persica* (L.) Batsch [1801])
Sapin de Douglas (*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco [1950])
Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
Thuya géant (*Thuja plicata* Donn ex D.Don [1824])

Viorne de Carles (*Viburnum carlesii* Hemsl. [1888])

Viorne (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. [1888])

Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont 141	Dont 97 sauvages	Dont 44 cultivées
Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :			
Carotte sauvage (Daucus carota L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.		<small>Source : Arn</small>
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare L. [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.		<small>Source : Anneli Salo</small>
Orchis bouc (Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. [1826])	Espèce sauvage C'est une espèce d'orchidée protégée dans la région AURA. Elle a une forte odeur de bouc.		<small>Source : Xabi Rome-Hérault</small>
Clématite des haies (Clematis vitalba L. [1753])	Espèce sauvage C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thécile du Bouleau.		<small>Source : J.F. Gaffard</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Aigremoine eupatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Cerfeuil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Gouet d'Italie (*Arum italicum* Mill. [1768])
Ballote noire (*Ballota nigra* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [1812])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Chardon faux-acanthe (*Carduus acanthoides* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse des champs (*Cirsium arvense* (L.) Scop. [1772])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Liseron des haies (*Convolvulus sepium* L. [1753])
Corydale solide (*Corydalis solida* (L.) Clairv. [1811])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Cyclamen à feuilles de lierre (*Cyclamen hederifolium* Aiton [1789])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Digitaire sanguine (*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [1771])
Roquette jaune (*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [1821])
Chiendent rampant (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium des Pyrénées (*Geranium pyrenaicum* Burm.f. [1759])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Houblon grimpant (*Humulus lupulus* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier blanc (*Lamium album* L. [1753])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])

Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Mercuriale annuelle (*Mercurialis annua* L. [1753])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Pariétaire des murs (*Parietaria judaica* L. [1756])
Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana* L. [1753])
Picride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Ronce de Bertram (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Oseille des prés (*Rumex acetosa* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
Sauge des prés (*Salvia pratensis* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Silène à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Silène enflé (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke [1869])
Douce amère (*Solanum dulcamara* L. [1753])
Tomate comestible (*Solanum lycopersicum* L. [1753])
Morelle noire (*Solanum nigrum* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])
Violette de Rivinus (*Viola riviniana* Rchb. [1823])

Espèces cultivées :

Sapin pectiné (*Abies alba* Mill. [1768])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson [1984])
Poireau (*Allium porrum* L. [1753])
Amarante hybride (*Amaranthus hybridus* L. [1753])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])

Bourrache officinale (*Borago officinalis* L. [1753])
Colza (*Brassica napus* L. [1753])
Piment enragé (*Capsicum frutescens* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Micocoulier occidental (*Celtis occidentalis* L. [1753])
Coriandre cultivée (*Coriandrum sativum* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Cosmos sulfureux (*Cosmos sulphureus* L. [1753])
Œillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum* L. [1753])
(*Dianthus* sp1)
Figuier commun (*Ficus carica* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Tournesol (*Helianthus annuus* L. [1753])
Troïne (*Ligustrum vulgare* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Menthe verte (*Mentha spicata* L. [1753])
Narcisse Jonquille (*Narcissus jonquilla* L. [1753])
Tabac de Virginie (*Nicotiana tabacum* L. [1753])
Olivier d'Europe (*Olea europaea* L. [1753])
Haricot commun (*Phaseolus vulgaris* L. [1753])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Framboisier (*Rubus idaeus* L. [1753])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Tomate comestible (*Solanum lycopersicum* L. [1753])
Thym commun (*Thymus vulgaris* L. [1753])
Tilleul argenté (*Tilia tomentosa* Moench [1785])
Faux jasmin (*Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. [1851])
Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])
Glycine de Chine (*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet [1826])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
165	89 sauvages	76 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Carotte sauvage (Daucus carota L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 <small>Source : Arn</small>
Coquelicot (Papaver rhoeas L. [1753])	Espèce sauvage Plante inféodée aux sols des champs de blé, on la qualifie de messicole. C'est l'icône de la biodiversité notamment pour la lutte contre les pesticides. C'est aussi un refuge : les abeilles la butinent, certains charançons viennent s'y loger et les oiseaux adorent ces graines.	 <small>Source : Dominique Mollicone</small>
Brunelle commune (Prunella vulgaris L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 <small>Source : Ivar Leidus</small>
Knautie des champs (Knautia arvensis (L.) Coult. [1828])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère qui attire de nombreux polliniseurs notamment l'Andrène de la scabieuse qui est une abeille sauvage spécialisée de cette herbacée.	 <small>Source : Darkone</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Ambroisie annuelle (*Ambrosia artemisiifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
(*Carex* L. [1753])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Œillet velu (*Dianthus armeria* L. [1753])
Œillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum* L. [1753])
Fougère mâle (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott [1834])
Chiendent rampant (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
Vergerette de Karvinski (*Erigeron karvinskianus* DC. [1836])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Lentillon (*Ervum tetraspermum* L. [1753])
Euphorbe maculée (*Euphorbia maculata* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium à feuilles découpées (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Houlque laineuse (*Holcus lanatus* L. [1753])
(*Hypericum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Knautie des champs (*Knautia arvensis* (L.) Coult. [1828])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Gesse des prés (*Lathyrus pratensis* L. [1753])
Linaire commune (*Linaria vulgaris* Mill. [1768])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve alcée (*Malva alcea* L. [1753])

Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Menthe à feuilles rondes (*Mentha suaveolens* Ehrh. [1792])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Coquelicot (*Papaver rhoeas* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle douteux (*Trifolium dubium* Sibth. [1794])
Trèfle incarnat (*Trifolium incarnatum* L. [1753])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Vulpie queue-d'écureuil (*Vulpia bromoides* (L.) Gray [1821])

Espèces cultivées :

Acore calame (*Acorus calamus* L. [1753])
Rose trémière (*Alcea rosea* L. [1753])
Estragon (*Artemisia dracunculus* L. [1753])
Bergenie (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch [1889])
Arbre aux papillons (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch [1889])
Souci officinal (*Calendula officinalis* L. [1753])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Coréopsis lancéolé (*Coreopsis lanceolata* L. [1753])
(*Coreopsis* sp2)
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea* L. [1753])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Late Cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Cotonéaster horizontal (*Cotoneaster horizontalis* Decne. [1879])
Echinacée pourpre (*Echinacea purpurea* (L.) Moench [1794])
Chardon bleu (*Echinops ritro* L. [1753])

Vipérine commune (*Echium vulgare* L. [1753])
Elaeagnus submacrophylla Servett (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Vergerette de Karvinski (*Erigeron karvinskianus* DC. [1836])
Giroflée des murailles (*Erysimum cheiri* (L.) Crantz [1769])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Patate de Virginie (*Helianthus tuberosus* L. [1753])
Immortelle d'Italie (*Helichrysum italicum* (Roth) G.Don [1830])
Hémérocalle fauve (*Hemerocallis fulva* (L.) L. [1762])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Sédum remarquable (*Hylotelephium spectabile* (Boreau) H.Ohba [1977])
Ibéris toujours vert (*Iberis sempervirens* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Genévrier rampant (*Juniperus horizontalis* Moench)
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavande papillon (*Lavandula stoechas* L. [1753])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Grande Marguerite (*Leucanthemum maximum* (Ramond) DC. [1837])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Troène (*Ligustrum vulgare* L. [1753])
Lin cultivé (*Linum usitatissimum* L. [1753])
Chèvrefeuille du Japon (*Lonicera japonica* Thunb. [1784])
Lotier hirsute (*Lotus hirsutus* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Minia cliviata (*Minia cliviata*)
Muscat à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myrte commun (*Myrtus communis* L. [1753])
Narcissus papyraceus (*Narcissus papyraceus* Ker Gawl. [1806])
Jonquille des bois (*Narcissus pseudonarcissus* L. [1753])
Nassella tenuissima (*Nassella tenuissima* (Trin.) Barkworth [1990])
Herbe aux chats (*Nepeta cataria* L. [1753])
Passiflore (*Passiflora caerulea* L. [1753])
Persil cultivé (*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill [1925])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Nerprun Alaterne (*Rhamnus alaternus* L. [1753])
Groseillier noir (*Ribes nigrum* L. [1753])
Groseillier rouge (*Ribes rubrum* L. [1753])
Rosier des haies (*Rosa canina* L. [1753])
Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Ronce de Bertram (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Sauge bleue (*Salvia farinacea* Benth. [1834])
Sauge à petites feuilles (*Salvia microphylla* Kunth [1818])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Santoline petit cyprès (*Santolina chamaecyparissus* L. [1753])
Scabieuse du Caucase (*Scabiosa caucasica* M.Bieb. [1808])
Sorbier sauvage (*Sorbus acuparia* L. [1753])
Spirée blanche (*Spiraea alba* Du Roi [1772])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
Thym commun (*Thymus vulgaris* L. [1753])
Palmier de Chusan (*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. [1862])
Verveine (*Verbena bonariensis* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])
Poivre sauvage (*Vitex agnus-castus* L. [1753])

Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])
Glycine de Chine (*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet [1826])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 89	Dont 72 sauvages	Dont 17 cultivées
---	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Sabline à feuilles de serpolet (<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. [1753])	Espèce sauvage Son nom provient du fait qu'elle pousse de préférence dans des lieux secs et sableux. C'est pourquoi nous la retrouvons aux interstices des pavés...	 Source : Génial Végétal
Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare</i> L. [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Mélisse officinale (<i>Melissa officinalis</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère qui attirent de nombreuses abeilles grâce à son nectar. Elle possède une odeur citronnée. Reine des infusions calmantes.	 Source : Gideon Pisanty
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Ballote noire (*Ballota nigra* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Liseron des haies (*Convolvulus sepium* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Œillet des Chartreux (*Dianthus carthusianorum* L. [1753])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue des murailles (*Lactuca muralis* (L.) G.Mey. [1836])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Mercuriale annuelle (*Mercurialis annua* L. [1753])
Myosotis des champs (*Myosotis arvensis* (L.) Hill [1764])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana* L. [1753])
Picride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])

Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Fausse fléole (*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev [1971])
(*Sagina* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Morelle noire (*Solanum nigrum* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Aster à feuilles de Saule (*Symphytum x salignum* (Willd.) G.L.Nesom [1995])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Erable de Tartarie (*Acer tataricum* L. [1753])
Gainier commun (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Elaeagnus Vahl (*Elaeagnus* Vahl [1804])
Forsythia Vahl (*Forsythia* Vahl [1804])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Genévrier rampant (*Juniperus horizontalis* Moench)
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Groseille indienne (*Symporicarpus orbiculatus* Moench [1794])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 109	Dont 71 sauvages	Dont 38 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Sabline à feuilles de serpolet (<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. [1753])	Espèce sauvage Son nom provient du fait qu'elle pousse de préférence dans des lieux secs et sableux. C'est pourquoi nous la retrouvons aux interstices des pavés...	 Source : Génial Végétal
Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare</i> L. [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Lierre grimpant (<i>Hedera helix</i> L. [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 Source : Joan-T
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Agrostide capillaire (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Ammi élevé (*Ammi majus* L. [1753])
Brome de Madrid (*Anisantha madritensis* (L.) Nevski [1934])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Capselle bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Chardon à capitules denses (*Carduus pycnocephalus* L. [1763])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe de Jovet (*Euphorbia maculata* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fenouil commun (*Foeniculum vulgare* Mill. [1768])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobsaea vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lobulaire maritime (*Lobularia maritima* (L.) Desv. [1815])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Mélique ciliée (*Melica ciliata* L. [1753])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Pariétaire des murs (*Parietaria judaica* L. [1756])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])

Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Saxifrage à trois doigts (*Saxifraga tridactylites* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle douteux (*Trifolium dubium* Sibth. [1794])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Abélie à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Achillée en ombelle (*Achillea umbellata* Sm. [1813])
Asphodèle blanc (*Asphodelus albus* Mill. [1768])
(*Bulbine*)
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Gainier commun (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Cognassier du Japon (*chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Délosperma (*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus [1927])
Elaeagnus submacrophylla Servett (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Vergerette de Karvinski (*Erigeron karvinskianus* DC. [1836])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Géranium à grosses racines (*Geranium macrorrhizum* L. [1753])
Porcelaine du Paraguay (*Graptopetalum paraguayense* (N.E.Br.) E.Walther [1938])
Immortelle d'Italie (*Helichrysum italicum* (Roth) G.Don [1830])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Millepertuis Androsème (*Hypericum androsaemum* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Genévrier occidental (*Juniperus occidentalis*)
Myrte commun (*Myrtus communis* L. [1753])
Menthe des chats (*Nepeta cataria* L. [1753])
Figuier de Barbarie (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. [1768])
Orpin bâtarde (*Phedimus spurius* (M.Bieb) 't Hart [1995])
Thuya d'Orient (*Platycladus orientalis* (L.) Franco [1949])
Prunier myrobolan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Saule blanc (*Salix alba* L. [1753])
Orpin à feuilles serrées (*Sedum dasypodium* L. [1753])
Kamchatka Stonecrop (*Sedum kamtschaticum* Fisch. & C.A.Mey. [1841])
Sedum pachyphyllum Rose (*Sedum pachyphyllum* Rose [1911])
Orpin de Bologne (*Sedum sexangulare* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])

Soude vraie (*Suaeda vera* Forssk. ex J.F.Gmel. [1791])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Thym commun (*Thymus vulgaris* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>



Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021

Nombre d'espèces recensées : 114	Dont 80 sauvages	Dont 34 cultivées
Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :		
Carotte sauvage	(<i>Daucus carota L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>  <p><i>Source : Arn</i></p>
Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>  <p><i>Source : Anneli Salo</i></p>
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>  <p><i>Source : Joan-T</i></p>
Clématite des haies	(<i>Clematis vitalba L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.</p>  <p><i>Source : J.F. Gaffard</i></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Persil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Brachypode des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [1812])
Capselle bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
(*Erigeron* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Herbe à Robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis couché (*Hypericum humifusum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Iris fétide (*Iris foetidissima* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Linaire commune (*Linaria vulgaris* Mill. [1768])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne naine (*Medicago minima* (L.) L. [1754])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Origan commun (*Origanum vulgare* L. [1753])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])

Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Picride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Fausse fléole (*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev [1971])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Sénéçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Silène à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])
Violette de Rivinus (*Viola riviniana* Rchb. [1823])
Vulpie queue-d'écureuil (*Vulpia bromoides* (L.) Gray [1821])

Espèces cultivées :

Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Bergenis (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch [1889])
Micocoulier occidental (*Celtis occidentalis* L. [1753])
Arbre de Judée (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Muguet (*Convallaria majalis* L. [1753])
Late Cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Délosperma (*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus [1927])
Hêtre commun (*Fagus sylvatica* L. [1753])
Figuier commun (*Ficus carica* L. [1753])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Hémérocalle fauve (*Hemerocallis fulva* (L.) L. [1762])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Iris fétide (*Iris foetidissima* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Arbre aux lanternes (*Koelreuteria paniculata* Laxm. [1772])
Laurier-cerise (*Laurus nobilis* L. [1753])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Pommier (*Malus* Mill. [1754])
Menthe verte (*Mentha spicata* L. [1753])
Basilic aux sauces (*Ocimum basilicum* L. [1753])
(*Oxalis* sp1)
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])

Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])

(*Rosa* L. [1753])

Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])

Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])

Tomate comestible (*Solanum lycopersicum* L. [1753])

Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])

Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])

Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])

(*Viola* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 70	Dont 59 sauvages	Dont 11 cultivées
---	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Trèfle rampant	(Trifolium repens L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.</p>	 <small>Source : Hans Hillewaert</small>
Brunelle commune	(Prunella vulgaris L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.</p>	 <small>Source : Ivar Leidus</small>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <small>Source : Joan-T</small>
Renoncule à petites fleurs	(Ranunculus parviflorus L. [1758])	<p>Espèce sauvage</p> <p>On la retrouve au bord des chemins, dans les champs ou les friches... C'est une plante qui est classée en danger d'extinction dans la région AURA.</p>	 <small>Source : Jacqueline BEAUMONT</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Aigremoine eupatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Chiendent rampant (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe de Jovet (*Euphorbia maculata* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Fausse fléole (*Rostraria cristata* (L.) Tzvelev [1971])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])

Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])

Espèces cultivées :

Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Late cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cyprès de Leyland (*Cupressus x leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. [1926])
Elaeagnus submacrophylla Servett (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 147	Dont 101 sauvages	Dont 46 cultivées
--	-----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Trèfle rampant	(Trifolium repens L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.</p>	 <p><u>Source</u> : Hans Hillewaert</p>
Brunelle commune	(Prunella vulgaris L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.</p>	 <p><u>Source</u> : Ivar Leidus</p>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p><u>Source</u> : Joan-T</p>
Carotte sauvage	(Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p><u>Source</u> : Arn</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuilles (*Achillea millefolium* L. [1753])
Bugle de Genève (*Ajuga genevensis* L. [1753])
Bugle rampante (*Ajuga reptans* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Gouet d'Italie (*Arum italicum* Mill. [1768])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia* L. [1753])
Capselle bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
(*Carex* L. [1753])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Brome purgatif (*Ceratochloa cathartica* (Vahl) Herter [1940])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Vipérine commune (*Echium vulgare* L. [1753])
Chiendent rampant (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigne (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
(*Festuca* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
Immortelle d'Allemagne (*Filago germanica* L. [1763])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Berce commune (*Heracleum sphondylium* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobsa vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])

Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Myosotis des champs (*Myosotis arvensis* (L.) Hill [1764])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Dame-d'onze-heures (*Ornithogalum divergens* Boreau [1857])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin bulbeux (*Poa bulbosa* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
(*Ranunculus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Oseille des prés (*Rumex acetosa* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Saxifrage granulé (*Saxifraga granulata* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Silène enflé (*Silene vulgaris* (Moench) Garcke [1869])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
(*Verbascum* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Véronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia* L. [1753])
Violette hérissee (*Viola hirta* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Violette de Rivinus (*Viola riviniana* Rchb. [1823])

Espèces cultivées :

Abélie à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Erable à écorce de papier (*Acer griseum* (Franch.) Pax [1902])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])

Marronnier commun (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Buis commun (*Buxus sempervirens* L. [1753])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Catalpa (*Catalpa bignonioides* Walter [1788])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Micocoulier occidental (*Celtis occidentalis* L. [1753])
Gainier commun (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Escallonia (*Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. [1805])
Fusain de Fortune (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. [1933])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Genévrier commun (*Juniperus communis* L. [1753])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Lis orangé à bulbille (*Lilium bulbiferum* L. [1753])
Tulipier de Virginie (*Liriodendron tulipifera* L. [1753])
Bambou sacré (*Nandina domestica*)
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Épicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Platane d'Espagne (*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh. [1770])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Chêne vert (*Quercus ilex* L. [1753])
Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Arbre de miel (*Sophora japonica* L. [1767])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Symphorine orbiculatus (*Symphoricarpos orbiculatus* Moench [1794])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Tilleul argenté (*Tilia tomentosa* Moench [1785])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 239	Dont 129 sauvages	Dont 110 cultivées
--	-----------------------------	------------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Clématite des haies	(Clematis vitalba L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.</p>	 <p><small>Source : J.F. Gaffard</small></p>
Renouée des oiseaux	(Polygonum aviculare L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>	 <p><small>Source : Anneli Salo</small></p>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p><small>Source : Joan-T</small></p>
Carotte sauvage	(Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les pollinisateurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p><small>Source : Arn</small></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Alliaire (*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [1913])
Ail maraîcher (*Allium oleraceum* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Persil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Bardane à petites têtes (*Arctium minus* (Hill) Bernh. [1800])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Armoise annuelle (*Artemisia annua* L. [1753])
Armoise de Chine (*Artemisia verlotiorum* Lamotte [1877])
Gouet d'Italie (*Arum italicum* Mill. [1768])
Avoine barbue (*Avena barbata* Pott ex Link [1799])
Ballote noire (*Ballota nigra* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv. [1812])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-pasteur (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Chondrille à tige de jonc (*Chondrilla juncea* L. [1753])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Cymbalaire des murs (*Cymbalaria muralis* G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [1800])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Œillet velu (*Dianthus armeria* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Vipérine commune (*Echium vulgare* L. [1753])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Vesce hérissée (*Ervilia hirsuta* (L.) Opiz [1852])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis* L. [1753])

Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Picride fausse-vipérine (*Helminthotheca echioides* (L.) Holub [1973])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Jacinthe sauvage (*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm. [1944])
(*Hypericum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier amplexicaule (*Lamium amplexicaule* L. [1753])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Lampsane commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Linaire commune (*Linaria vulgaris* Mill. [1768])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne naine (*Medicago minima* (L.) L. [1754])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Muscat à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Origan commun (*Origanum vulgare* L. [1753])
Dame-d'onze-heures (*Ornithogalum divergens* Boreau [1857])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Coquelicot (*Papaver rhoeas* L. [1753])
Pariétaire des murs (*Parietaria judaica* L. [1756])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin bulbeux (*Poa bulbosa* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Coucou (*Primula veris* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Ronce de Bertram (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Oseille des prés (*Rumex acetosa* L. [1753])
Petite oseille (*Rumex acetosella* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])

(*Sagina* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Saxifrages à trois doigts (*Saxifraga tridactylites* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
Mâche dentée (*Valerianella dentata* (L.) Pollich [1776])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Véronique luisante (*Veronica polita* Fr. [1819])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Abélie à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Marronnier à fleurs couleur de chair (*Aesculus carnea* Hayne [1822])
Marronnier commun (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Verveine odorante (*Aloysia citrodora* Palau [1784])
Anémone du Japon (*Anemone hupehensis* var. *japonica* (Thunb.) Bowles & Stearn [1947])
Arbousier commun (*Arbutus unedo* L. [1753])
Armoise absinthe (*Artemisia absinthium* L. [1753])
Estragon (*Artemisia dracunculus* L. [1753])
Berbériis de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Berbériis à feuilles étroites (*Berberis x stenophylla* Lindl. [1864])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Souci officinal (*Calendula officinalis* L. [1753])
Micocoulier de provence (*Celtis australis* L. [1753])
Centranthe rouge (*Centranthus ruber* (L.) DC. [1805])
Chimonanthe odorant (*Chimonanthus fragrans* Lindl. [1820])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Cornouiller blanc (*Cornus alba* L. [1767])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Cotonéaster laiteux (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
(*Crassula* L. [1753])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Cyprès de Montpellier (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Deutzia (*Deutzia scabra* Thunb. [1781])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Giroflée des murailles (*Erysimum cheiri* (L.) Crantz [1769])
Euryops pectiné (*Euryops pectinatus* (L.) Cass. [1820])
Fétueque glauque (*Festuca glauca* Vill. [1787])
Figuier commun (*Ficus carica* L. [1753])

Fenouil commun (*Foeniculum vulgare* Mill. [1768])
Forsythia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Gaillarde (*Gaillardia aristata* Pursh [1814])
Grevillea rosmarinifolia (*Grevillea rosmarinifolia* A.Cunn. [1825])
Immortelle d'Italie (*Helichrysum italicum* (Roth) G.Don [1830])
Heuchère sanguine (*Heuchera sanguinea* Engelm.)
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Millepertuis à grandes fleurs (*Hypericum grandifolium* Choisy)
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Genévrier commun (*Juniperus communis* L. [1753])
Genévrier de Virginie (*Juniperus virginiana* L. [1753])
Buisson de beauté (*Kolkwitzia amabilis* Graebn. [1901])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavande à larges feuilles (*Lavandula latifolia* Medik. [1784])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Troène (*Ligustrum vulgare* L. [1753])
Chèvrefeuille du Japon (*Lonicera japonica* Thunb. [1784])
Chèvrefeuille (*Lonicera nitida* E.H.Wilson [1911])
Pommier (*Malus* Mill. [1754])
Lavetière maritime (*Malva subovata* (DC.) Molero & J.M.Monts.)
(*Mentha* L. [1753])
Roseau chinois (*Miscanthus sinensis* Andersson [1855])
Mûrier noir (*Morus nigra* L. [1753])
(*Myosotis* L. [1753])
Bambou sacré (*Nandina domestica*)
Jonquille des bois (*Narcissus jonquilla* L. [1753])
(*Oenothera* L. [1753])
Origan commun (*Origanum vulgare* L. [1753])
Osmanthe de Burkwood (*Osmanthus x burkwoodii* (Burkwood. & Skipw.) P.S.Green)
Passiflore (*Passiflora caerulea* L. [1753])
Sauge d'Afghanistan (*Perovskia atriplicifolia* Benth)
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Lin de Nouvelle-Zélande (*Phormium tenax* J.R.Forst. & G.Forst. [1776])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Bambou noir (*Phyllostachys nigra* (Lodd. ex Lindl.) Munro [1868])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Epicéa du Colorado (*Picea pungens* Engelm. [1879])
Pin de montagne (*Pinus mugo* Turra [1764])
Arbre des Hottentots (*ittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton [1811])
Abricotier commun (*Prunus armeniaca* L. [1753])
Cerisier acide (*Prunus cerasus* L. [1753])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Mirabelle (*Prunus x cerea* (L.) Ehrh. [1792])
Pyracantha (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Poirier commun (*Pyrus communis* L. [1753])
Groseillier des Alpes (*Ribes alpinum* L. [1753])
Goseillier noir (*Ribes nigrum* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Romain officinal (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Framboisier (*Rubus idaeus* L. [1753])
Petit houx (*Ruscus aculeatus* L. [1753])
Sauge rouge écarlate (*Salvia coccinea* Buch'oz ex Etz. [1777])

Sauge à petites feuilles (*Salvia microphylla* Kunth [1818])
Sauge des forêts (*Salvia nemorosa* L. [1762])
Sauge officinale (*Salvia officinalis* L. [1753])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Sarriette de montagne (*Satureja montana* L. [1753])
Orpin de Palmer (*Sedum palmeri* S.Watson [1882])
Spirée de Canton (*Spiraea cantoniensis* Lour. [1790])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
If du Japon (*Taxus cuspidata* Siebold & Zucc.)
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Thym commun (*Thymus vulgaris* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Viorne mancienne (*Viburnum lantana* L. [1753])
Viorne (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. [1888])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])
Petite pervenche (*Vinca minor* L. [1753])
Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])
Yucca gloriosa (*Yucca gloriosa* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 139	Dont 78 sauvages	Dont 61 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Trèfle rampant	(<i>Trifolium repens</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.</p>	 <p><small>Source : Hans Hillewaert</small></p>
Brunelle commune	(<i>Prunella vulgaris</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.</p>	 <p><small>Source : Ivar Leidus</small></p>
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p><small>Source : Joan-T</small></p>
Renoncule à petites fleurs	(<i>Ranunculus parviflorus</i> L. [1758])	<p>Espèce sauvage</p> <p>On la retrouve au bord des chemins, dans les champs ou les friches... C'est une plante qui est classée en danger d'extinction dans la région AURA.</p>	 <p><small>Source : Jacqueline BEAUMONT</small></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (Achillea millefolium L. [1753])
Bugle rampante (Ajuga reptans L. [1753])
Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia L. [1753])
Brome stérile (Anisantha sterilis (L.) Nevski [1934])
Cerfeuil commun (Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. [1814])
Alchémille des champs (Aphanes arvensis L. [1753])
Arabette de thalius (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (Bellis perennis L. [1753])
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta L. [1753])
Laîche écartée (Carex divulsa Stokes [1787])
Pâturin rigide (Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (Cerastium fontanum Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill. [1799])
Cirse commun (Cirsium vulgare (Savi) Ten. [1838])
Liseron des champs (Convolvulus arvensis L. [1753])
Crépide capillaire (Crepis capillaris (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (Crepis sancta (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (Crepis setosa Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L. [1753])
Chiendent commun (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Conyze du Canada (Erigeron canadensis L. [1753])
(Erigeron L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (Erodium cicutarium (L.) L'Hér. [1789])
Vesce hérissée (Ervilia hirsuta (L.) Opiz [1852])
Euphorbe omblette (Euphorbia peplus L. [1753])
(Festuca L. [1753])
Ficaire printanière (Ficaria verna Huds. [1762])
(Filago L. [1753])
Gaillet gratteron (Galium aparine L. [1753])
Gaillet commun (Galium mollugo L. [1753])
Géranium découpé (Geranium dissectum L. [1755])
Géranium à feuilles molles (Geranium molle L. [1753])
Géranium fluet (Geranium pusillum L. [1759])
Herbe à robert (Geranium robertianum L. [1753])
Benoîte commune (Geum urbanum L. [1753])
Lierre grimpant (Hedera helix L. [1753])
Orge sauvage (Hordeum murinum L. [1753])
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata L. [1753])
Laitue scariole (Lactuca serriola L. [1756])
Fétuque élevée (Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. [1993])
Ivraie vivace (Lolium perenne L. [1753])
Luzerne tachetée (Medicago arabica (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (Medicago lupulina L. [1753])
(Milium L. [1753])
Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Roche [1814])
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Oxalis dressé (Oxalis dillenii Jacq. [1794])
Piloselle (Pilosella officinarum Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])
Plantain majeur (Plantago major L. [1753])

Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
(*Poa annua* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Oseille des prés (*Rumex acetosa* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Laïteron rude (*Sonchus asper* (L.) Hill [1769])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Abélia à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Arbousier commun (*Arbutus unedo* L. [1753])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Berbérias à feuilles étroites (*Berberis x stenophylla* Lindl. [1864])
Bouleau verrueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Arbre aux papillons (*Buddleja davidii* Franch. [1887])
Buis commun (*Buxus sempervirens* L. [1753])
Catalpa (*Catalpa bignonioides* Walter [1788])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Cognassier du Japon (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])
Sotol bleu (*Dasyliion wheeleri*)
Elaeagnus submacrophylla Servett (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Fusain du Japon (*Euonymus japonicus* L.f. [1780])
Euryops pectiné (*Euryops pectinatus* (L.) Cass. [1820])
Hêtre commun (*Fagus sylvatica* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Iris fétide (*Iris foetidissima* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])

Laurier-cerise (*Laurus nobilis* L. [1753])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Manuka (*Leptospermum scoparium* J.R. Forst. & G. Forst. [1775])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Chèvrefeuille (*Lonicera nitida* E.H.Wilson [1911])
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora* L. [1759])
Magnolia à fleurs de Lis (*Magnolia liliiflora* Desr. [1792])
Olivier d'Europe (*Olea europaea* L. [1753])
Figuier de barbarie (*Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. [1768])
(*Paeonia* L. [1753])
Pavot d'Islande (*Papaver croceum* Ledeb. [1830])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Platane d'Espagne (*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh. [1770])
Thuya d'Orient (*Platycladus orientalis* (L.) Franco [1949])
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Prunier du Portugal (*Prunus lusitanica* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Sapin de Douglas (*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco [1950])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Rhododendron poilu (*Rhododendron hirsutum* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
Orpin de Palmer (*Sedum palmeri* S.Watson [1882])
Symphorine à fruits blancs (*Symphoricarpos albus* (L.) S.F.Blake [1914])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Pensée sauvage (*Viola tricolor* L. [1753])
Yucca filamentosa (*Yucca filamentosa* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 54	Dont 36 sauvages	Dont 18 cultivées
---	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>	 <p>Source : Anneli Salo</p>
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p>Source : Joan-T</p>
Carotte sauvage	(<i>Daucus carota</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les pollinisateurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p>Source : Arn</p>
Ronce commune	(<i>Rubus fruticosus</i> L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui permet de protéger les hérissons ou encore les nids d'oiseaux contre divers prédateurs. C'est aussi une source de nourriture pour les pollinisateurs (papillons, abeilles...).</p>	 <p>Source : Dominicus Johannes Bergsma</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Armoise annuelle (*Artemisia annua* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Liseron des haies (*Convolvulus sepium* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Chiendent commun (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Eragrostide Amourette (*Eragrostis ciliaris* (All.) Vignolo ex Janch. [1907])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Picride fausse-vipérine (*Helminthotheca echioides* (L.) Holub [1973])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Sétaire verticillée (*Setaria P. Beauvois.* [1812])
Morelle noire (*Solanum nigrum* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Troène du Japon (*Ligustrum japonicum* Thunb. [1780])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Chèvrefeuille (*Lonicera nitida* E.H.Wilson [1911])
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora* L. [1759])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])

Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Viorne (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. [1888])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
126	87 sauvages	39 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Trèfle rampant	(<i>Trifolium repens</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.	 Source : Hans Hillewaert
Brunelle commune	(<i>Prunella vulgaris</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus
Carotte sauvage	(<i>Daucus carota</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 Source : Arn
Orchis bouc	(<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. [1826])	Espèce sauvage C'est une espèce d'orchidée protégée dans la région AURA. Elle a une forte odeur de bouc.	 Source : Xabi Rome-Hérault

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Bugle genève (*Ajuga genevensis* L. [1753])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Avoine barbue (*Avena barbata* Pott ex Link [1799])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Cirse des champs (*Cirsium arvense* (L.) Scop. [1772])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Eragrostide Amourette (*Eragrostis ciliaris* (All.) Vignolo ex Janch. [1907])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque des moutons (*Festuca ovina* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobaea vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])

Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne naine (*Medicago minima* (L.) L. [1754])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Pricride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Poivre de muraille (*Sedum acre* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Silènes à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Morelle noire (*Solanum nigrum* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Sporobole fertile (*Sporobolus indicus* (L.) R.Br. [1810])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Arbre à soie (*Albizia julibrissin* Durazz. [1772])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Arbre aux papillons (*Buddleja davidii* Franch. [1887])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Centranthe rouge (*Centranthus ruber* (L.) DC. [1805])
Herbe de la Pampa (*Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. [1900])
Late cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Echinacée pourpre (*Echinacea purpurea* (L.) Moench [1794])
Euphorbe des vallons (*Euphorbia characias* L. [1753])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Heuchère sanguine (*Heuchera sanguinea* Engelm)
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Troeïne du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])

Narcisse des poètes (*Narcissus poeticus* L. [1753])
Jonquille des bois (*Narcissus pseudonarcissus* L. [1753])
Laurier rose (*Nerium oleander* L. [1753])
Pavot d'Islande (*Papaver croceum* Ledeb. [1830])
Bambou moso (*Phyllostachys edulis* (Carrière) Lehaie [1906])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Pin pleureur de l'Himalaya (*Pinus wallichiana* A.B.Jacks. [1947])
Peuplier noir d'Italie (*Populus nigra* var. *italica* Du Roi [1772])
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Sumac hérissé (*Rhus typhina* L. [1756])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Sauge à petites feuilles (*Salvia microphylla* Kunth [1818])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
(*Tulipa* L. [1753])
Verveine (*Verbena bonariensis* L. [1753])
Glycine de Chine (*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet [1826])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021

Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
143	99 sauvages	44 cultivées
Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :		
Clématite des haies	(Clematis vitalba L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.</p>  <p><small>Source : J.F. Gaffard</small></p>
Brunelle commune	(Prunella vulgaris L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.</p>  <p><small>Source : Ivar Leidus</small></p>
Carotte sauvage	(Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les pollinisateurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>  <p><small>Source : Arn</small></p>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>  <p><small>Source : Joan-T</small></p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
(*Agrostis* L. [1753])
Ail maraîcher (*Allium oleraceum* L. [1753])
Cerfeuil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
(*Carex* L. [1753])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Centranthe rouge (*Centranthus ruber* (L.) DC. [1805])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Souchet vigoureux (*Cyperus eragrostis* Lam. [1791])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Vesce hérissée (*Ervilia hirsuta* (L.) Opiz [1852])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Picride fausse-vipérine (*Helminthotheca echinoides* (L.) Holub [1973])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle engrainée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobsa vulgaris* Gaertn. [1791])
Jonc épars (*Juncus effusus* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Passerage drave (*Lepidium draba* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])

Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne naine (*Medicago minima* (L.) L. [1754])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Renouée Persicaire (*Persicaria maculosa* Gray [1821])
Pricride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Potentille dressée (*Potentilla recta* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Petite oseille (*Rumex acetosella* L. [1753])
Patience agglomérée (*Rumex conglomeratus* Murray [1770])
(*Sagina* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Saxifrage à trois doigts (*Saxifraga tridactylites* L. [1753])
Poivre de muraille (*Sedum acre* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P. Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis des champs (*Torilis arvensis* (Huds.) Link [1821])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Bergenie (*Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch [1889])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])

Cornouiller blanc (*Cornus alba* L. [1767])
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Orne (*Fraxinus ornus* L. [1753])
Ginkgo (*Ginkgo biloba* L. [1771])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Hortensia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. [1830])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Genévrier rampant (*Juniperus horizontalis* Moench)
Lavande officinale (*Lavandula angustifolia* Mill. [1768])
Chèvrefeuille du Japon (*Lonicera japonica* Thunb. [1784])
Chèvrefeuille à feuilles de Troène (*Lonicera pileata* Oliv. [1887])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Peuplier noir d'Italie (*Populus nigra* var. *italica* Du Roi [1772])
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Prunier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
(*Rosa* L. [1753])
Saule blanc (*Salix alba* L. [1753])
Saule drapé (*Salix eleagnos* Scop. [1772])
Spirée blanche (*Spiraea alba* Du Roi [1772])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])
Glycine de Chine (*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet [1826])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées :	Dont	Dont
73	54 sauvages	19 cultivées

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Trèfle rampant	(<i>Trifolium repens</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.	 Source : Hans Hillewaert
Brunelle commune	(<i>Prunella vulgaris</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus
Cardamine hérissée	(<i>Cardamine hirsuta</i> L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante hôte de la chenille du papillon Aurore.	 Source : Patrice78500
Renoncule à petites fleurs	(<i>Ranunculus parviflorus</i> L. [1758])	Espèce sauvage On la retrouve au bord des chemins, dans les champs ou les friches... C'est une plante qui est classée en danger d'extinction dans la région AURA.	 Source : Jacqueline BEAUMONT

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Andryale à feuilles entières (*Andryala integrifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Cerfeuil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Armoise annuelle (*Artemisia annua* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
(*Carex* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Vergerette de Karvinski (*Erigeron karvinskianus* DC. [1836])
(*Erigeron* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétueque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Houlque laineuse (*Holcus lanatus* L. [1753])
Millepertuis couché (*Hypericum humifusum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Bouton d'Or (*Ranunculus acris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parleys (*Torilis Adans.* [1763])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])

Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Véronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable japonais (*Acer palmatum* Thunb. [1784])
Arbre aux papillons (*Buddleja davidii* Franch. [1887])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Fougère mâle (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott [1834])
Géranium à grosses racines (*Geranium macrorrhizum* L. [1753])
Lierre d'Irlande (*Hedera hibernica* (Kirchn.) Bean [1914])
Jasmin à fleurs nues (*Jasminum nudiflorum* Lindl. [1846])
Troène de Chine (*Ligustrum sinense* Lour. [1790])
Chèvrefeuille (*Lonicera nitida* E.H.Wilson [1911])
Magnolia dénudé (*Magnolia denudata* Desr. [1792])
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora* L. [1759])
Roseau chinois (*Miscanthus sinensis* Andersson [1855])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Plystic à frondes soyeuses (*Polystichum setiferum* (Forssk.) T.Moore ex Woyn. [1913])
Prunier du Portugal (*Prunus lusitanica* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
(*Rosa* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021

Nombre d'espèces recensées :	Dont 76 sauvages	Dont 44 cultivées
------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Brunelle commune	(<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nichier et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 Source : Joan-T
Clématite des haies	(<i>Clematis vitalba L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.	 Source : J.F. Gaffard

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Bugle rampante (*Ajuga reptans* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Amarante réfléchie (*Amaranthus retroflexus* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche divisée (*Carex divisa* Huds. [1762])
(*Carex* L. [1753])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Cirse des champs (*Cirsium arvense* (L.) Scop. [1772])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Hieracium L. [1753])
Epervière des murs (*Hieracium murorum* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])

Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P. Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laîteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle douteux (*Trifolium dubium* Sibth. [1794])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Véronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Violette de rivin (*Viola riviniana* Rchb. [1823])

Espèces cultivées :

Abélia à grandes fleurs (*Abelia x grandiflora* (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Sapin du Colorado (*Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. [1861])
Erable à écorce de papier (*Acer griseum* (Franch.) Pax [1902])
Erable du Japon (*Acer schirazawanum*)
Aulne glutineux (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. [1790])
Aucuba Japonais (*Aucuba japonica* Thunb. [1783])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Catalpa (*Catalpa bignonioides* Walter [1788])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Cognassier du Japon (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Cyprès de l'Arizona (*Cupressus arizonica* Greene [1882])
Deutzia (*Deutzia scabra* Thunb. [1781])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Bonnet-d'évêque (*Euonymus europaeus* L. [1753])
Ginkgo (*Ginkgo biloba* L. [1771])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Hortensia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. [1830])
Buisson de beauté (*Kolkwitzia amabilis* Graebn. [1901])
Faux-ébénier (*Laburnum anagyroides* Medik. [1787])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Tulipier de Virginie (*Liriodendron tulipifera* L. [1753])
Magnolia à fleurs de Lis (*Magnolia liliiflora* Desr. [1792])

Bambou sacré (*Nandina domestica*)
Vigne vierge à trois becs (*Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch. [1887])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Grenadier commun (*Punica granatum* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Viorne de Chine (*Viburnum plicatum* Thunb. [1784])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 125	Dont 91 sauvages	Dont 34 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux	(<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.</p>	 <p>Source : Anneli Salo</p>
Orchis bouc	(<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng. [1826])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une espèce d'orchidée protégée dans la région AURA. Elle a une forte odeur de bouc.</p>	 <p>Source : Xabi Rome-Hérault</p>
Lierre grimpant	(<i>Hedera helix L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux pollinisateurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p>Source : Joan-T</p>
Mélisse officinale	(<i>Melissa officinalis L.</i> [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère qui attire de nombreuses abeilles grâce à son nectar. Elle possède une odeur citronnée. Reine des infusions calmantes.</p>	 <p>Source : Gideon Pisanty</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Doradille noir (*Asplenium adiantum-nigrum* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. [1812])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Cirse des champs (*Cirsium arvense* (L.) Scop. [1772])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Fougère mâle (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott [1834])
Chiendent commun (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
(*Festuca* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier amplexicaule (*Lamium amplexicaule* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])

Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Roche [1814])
Orobanche du lierre (Orobanche hederae Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Oxalis dressé (Oxalis dillenii Jacq. [1794])
Pariétaire des murs (Parietaria judaica L. [1756])
Panais cultivé (Pastinaca sativa L. [1753])
Pricride éperviaire (Picris hieracioides L. [1753])
Piloselle (Pilosella officinarum Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])
Plantain majeur (Plantago major L. [1753])
Plantain moyen (Plantago media L. [1753])
Pâturin annuel (Poa annua L. [1753])
Pâturin bulbeux (Poa bulbosa L. [1753])
Pâturin commun (Poa trivialis L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (Polycarpon tetraphyllum (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare L. [1753])
Potentille rampante (Potentilla reptans L. [1753])
Brunelle commune (Prunella vulgaris L. [1753])
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus L. [1753])
Renoncule rampante (Ranunculus repens L. [1753])
Patience élégante (Rumex pulcher L. [1753])
Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites L. [1753])
Poivre de muraille (Sedum acre L. [1753])
Orpin blanc (Sedum album L. [1753])
Séneçon commun (Senecio vulgaris L. [1753])
Millet des oiseaux (Setaria italica (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (Sherardia arvensis L. [1753])
Silènes à feuilles larges (Silene latifolia Poir. [1789])
Mouron des oiseaux (Stellaria media (L.) Vill. [1789])
Grande consoude (Symphytum officinale L. [1753])
Pissenlit officinal (Taraxacum officinale F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (Torilis nodosa (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (Trifolium pratense L. [1753])
Trèfle rampant (Trifolium repens L. [1753])
Ortie dioïque (Urtica dioica L. [1753])
Mache doucette (Valerianella locusta (L.) Laterr. [1821])
Véronique des champs (Veronica arvensis L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia L. [1753])
Véronique de Perse (Veronica persica Poir. [1808])
(Viola L. [1753])

Espèces cultivées :

Abélia à grandes fleurs (Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder [1900])
Erable plane (Acer platanoides L. [1753])
Aucuba Japonais (Aucuba japonica Thunb. [1783])
Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth [1788])
Charme (Carpinus betulus L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Cèdre de l'Atlas (Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. [1866])
Oranger du Mexique (Choisya ternata Kunth [1823])
Cornouiller soyeux (Cornus sericea L. [1771])
Cotonéaster de Franchet (Cotoneaster franchetii Bois [1902])
Cyprès d'Italie (Cupressus sempervirens L. [1753])
Forsytia Vahl (Forsythia Vahl [1804])
Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva (L.) L. [1762])
Heuchère sanguine (Heuchera sanguinea Engelm)

Hortensia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. [1830])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Laurier-cerise (*Laurus nobilis* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum ovalifolium* Hassk. [1844])
Chèvrefeuille des jardins (*Lonicera caprifolium* L. [1753])
Paulownia (*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. [1841])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Filaire intermédiaire (*Phillyrea media* L. [1759])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Prunier du Portugal (*Prunus lusitanica* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Rosier des haies (*Rosa canina* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Spirée de Thunberg (*Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume [1826])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Petite pervenche (*Vinca minor* L. [1753])
Weigela florida (Weigela florida (Bunge) A.DC. [1839])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 133	Dont 94 sauvages	Dont 39 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 <small>Source : Anneli Salo</small>
Trèfle rampant (<i>Trifolium repens L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.	 <small>Source : Hans Hillewaert</small>
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 <small>Source : Joan-T</small>
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 <small>Source : Ivar Leidus</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Alliaire (*Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande [1913])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Ambroisie annuelle (*Ambrosia artemisiifolia* L. [1753])
Andryale à feuilles entières (*Andryala integrifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Sabline à feuilles de serpolet (*Arenaria serpyllifolia* L. [1753])
Gouet d'Italie (*Arum italicum* Mill. [1768])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Liseron des haies (*Convolvulus sepium* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Digitaire commune (*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. [1771])
Vipérine à feuilles de plantain (*Echium plantagineum* L. [1771])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigne (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe petit-cyprès (*Euphorbia cyparissias* L. [1753])
Euphorbe maculée (*Euphorbia maculata* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétueque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
(*Filago* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobsa vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Linaire commune (*Linaria vulgaris* Mill. [1768])

Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Raisin d'Amérique (*Phytolacca americana* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Radis sauvage (*Raphanus raphanistrum* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Orpin pourpier (*Sedum cepaea* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Trèfle Porte-fraises (*Trifolium fragiferum* L. [1753])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Matricaire inodore (*Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch.Bip. [1844])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Vulpie queue-de-rat (*Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. [1805])

Espèces cultivées :

Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Buis commun (*Buxus sempervirens* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Gainier commun (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Cognassier du Japon (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Buisson confetti rose (*Coleonema pulchrum*)
Cornouiller mâle (*Cornus mas* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Late cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])

Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Escallonia (*Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. [1805])
Fusain de Fortune (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. [1933])
Niagara (*Exochorda racemosa*)
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora* L. [1759])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Epicéa rouge (*Picea rubens* Sarg)
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Chêne pubescent (*Quercus pubescens* Willd. [1805])
Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Sureau noir (*Sambucus nigra* L. [1753])
Orpin réfléchi (*Sedum rupestre* L. [1753])
Spirée de Thunberg (*Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume [1826])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])
Weigela florida (*Weigela florida* (Bunge) A.DC. [1839])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 113	Dont 77 sauvages	Dont 36 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Carotte sauvage (<i>Daucus carota L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 Source : Arn
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 Source : Joan-T
Clématite des haies (<i>Clematis vitalba L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.	 Source : J.F. Gaffard

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Bardane à petites têtes (*Arctium minus* (Hill) Bernh. [1800])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Roquette jaune (*Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC. [1821])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobaea vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Nigelle de Damas (*Nigella damascena* L. [1753])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Pricroide éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])

Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Violette de rivin (*Viola riviniana* Rchb. [1823])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Berbéri de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Late cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cotonéaster de Franchet (*Cotoneaster franchetii* Bois [1902])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Deutzia (*Deutzia scabra* Thunb. [1781])
Figuier Caque (*Diospyros kaki* L.f. [1782])
Echinacée pourpre (*Echinacea purpurea* (L.) Moench [1794])
Oléaster (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Fusain de Fortune (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. [1933])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Géranium à grosses racines (*Geranium macrorrhizum* L. [1753])
Iris fétide (*Iris foetidissima* L. [1753])
Muscat à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Nassella tenuissima (*Nassella tenuissima* (Trin.) Barkworth [1990])
Népeta de Mussin (*Nepeta racemosa* Lam. [1785])
Seringa commun (*Philadelphus coronarius* L. [1753])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Prunier myrobolan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Cerisier acide (*Prunus cerasus* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
(*Rosa* L. [1753])

Spirée blanche (*Spiraea alba* Du Roi [1772])
Spirée à feuilles de petit chêne (*Spiraea chamaedryfolia* L. [1753])
Spirée tomenteuse (*Spiraea tomentosa* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
(*Tulipa* L. [1753])
Viorne (*Viburnum rhytidophyllum* Hemsl. [1888])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 184	Dont 122 sauvages	Dont 62 cultivées
--	-----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Carotte sauvage (<i>Daucus carota L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 Source : Arn
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 Source : Joan-T
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Ail maraîcher (*Allium oleraceum* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Andryale à feuilles entières (*Andryala integrifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Cerfeuil des bois (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. [1814])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Armoise de Chine (*Artemisia verlotiorum* Lamotte [1877])
Gouet d'Italie (*Arum italicum* Mill. [1768])
Ballote noire (*Ballota nigra* L. [1753])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome des bois (*Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. [1812])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia* L. [1753])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse des champs (*Cirsium arvense* (L.) Scop. [1772])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Sariette commune (*Clinopodium vulgare* L. [1753])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Cyclamen à feuilles de lierre (*Cyclamen hederifolium* Aiton [1789])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigne (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe petit-cyprès (*Euphorbia cyparissias* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétueque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])

Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Picride fausse-vipérine (*Helminthotheca echoioides* (L.) Holub [1973])
Epervière des murs (*Hieracium murorum* L. [1753])
Orchis bouc (*Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng. [1826])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier amplexicaule (*Lamium amplexicaule* L. [1753])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Lampsana commune (*Lapsana communis* L. [1753])
Gesse des bois (*Lathyrus sylvestris* L. [1753])
Passerage drave (*Lepidium draba* L. [1753])
Passerage à feuilles de graminée (*Lepidium graminifolium* L. [1759])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Origan commun (*Origanum vulgare* L. [1753])
Orobanche du lierre (*Orobanche hederae* Vaucher ex Duby [1828])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Picride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Piloselle (*Pilosella officinarum* Vail. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Prunier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb* L. [1753])
Bouton d'Or (*Ranunculus acris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Rosier des haies (*Rosa canina* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Petite oseille (*Rumex acetosella* L. [1753])
Patience à crêtes (*Rumex cristatus* DC. [1813])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Silènes à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Morelle noire (*Solanum nigrum* L. [1753])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])

Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])
Gui des feuillus (*Viscum album* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (*Acer campestre* L. [1753])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Bouleau verrueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Buis commun (*Buxus sempervirens* L. [1753])
Théier (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze [1887])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Centranthe rouge (*Centranthus ruber* (L.) DC. [1805])
Cognassier du Japon (*Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach [1834])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])
Cornouiller sanguin (*Cornus sanguinea* L. [1753])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Giroflée des murailles (*Erysimum cheiri* (L.) Crantz [1769])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Frêne à feuilles étroites (*Fraxinus angustifolia* Vahl [1804])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Géranium à grosses racines (*Geranium macrorrhizum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Corète (*Kerria japonica* (L.) DC. [1818])
Arbre aux lanternes (*Koelreuteria paniculata* Laxm. [1772])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Lavandin (*Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. [1828])
Chèvrefeuille (*Lonicera nitida* E.H.Wilson [1911])
Mûrier noir (*Morus nigra* L. [1753])
Laurier rose (*Nerium oleander* L. [1753])
Sauge d'Afghanistan (*Perovskia atriplicifolia* Benth)
Épicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Pin pleureur de l'Himalaya (*Pinus wallichiana* A.B.Jacks. [1947])
Platane d'Espagne (*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh. [1770])
Peuplier noir d'Italie (*Populus nigra* var. *italica* Du Roi [1772])
Prunier myrobolan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])

Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Prunier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Prunellier (*Prunus spinosa* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Poirier de Chine (*Pyrus calleryana* Decne. [1858])
Chêne pubescent (*Quercus pubescens* Willd. [1805])
Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra* L. [1753])
Robinier faux-acacia (*Robinia pseudoacacia* L. [1753])
Rosier des haies (*Rosa canina* L. [1753])
Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Arbre de miel (*Sophora japonica* L. [1767])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Lilas commun (*Syringa vulgaris* L. [1753])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])
Petit orme (*Ulmus minor* Mill. [1768])
Viorne mancienne (*Viburnum lantana* L. [1753])
Weigela florida (Weigela florida (Bunge) A.DC. [1839])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 135	Dont 84 sauvages	Dont 51 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 Source : Anneli Salo
Carotte sauvage (<i>Daucus carota L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 Source : Arn
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 Source : Joan-T
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 Source : Ivar Leidus

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (Achillea millefolium L. [1753])
Bugle rampante (Ajuga reptans L. [1753])
Amarante couchée (Amaranthus deflexus L. [1771])
Alchémille des champs (Aphanes arvensis L. [1753])
Pâquerette (Bellis perennis L. [1753])
Capselle bourse-à-paster (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta L. [1753])
Laîche écartée (Carex divulsa Stokes [1787])
(Carex L. [1753])
Pâturin rigide (Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. [1953])
Centaurée jacée (Centaurea jacea L. [1753])
Céraiste commune (Cerastium fontanum Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill. [1799])
Chénopode blanc (Chenopodium album L. [1753])
Calament glanduleux (Clinopodium nepeta (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (Convolvulus arvensis L. [1753])
Crépide capillaire (Crepis capillaris (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (Crepis sancta (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (Crepis setosa Haller f. [1797])
Chiendent pied-de-poule (Cynodon dactylon (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L. [1753])
Carotte sauvage (Daucus carota L. [1753])
Drave de printemps (Draba verna L. [1753])
Vergerette annuelle (Erigeron annuus (L.) Desf. [1804])
(Erigeron L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (Erodium cicutarium (L.) L'Hér. [1789])
(Festuca L. [1753])
Ficaire printanière (Ficaria verna Huds. [1762])
Immortelle d'Allemagne (Filago germanica L. [1763])
Gaillet commun (Galium mollugo L. [1753])
Géranium à feuilles molles (Geranium molle L. [1753])
Lierre terrestre (Glechoma hederacea L. [1753])
Lierre grimpant (Hedera helix L. [1753])
Houlque laineuse (Holcus lanatus L. [1753])
Orge sauvage (Hordeum murinum L. [1753])
Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata L. [1753])
Laitue scariole (Lactuca serriola L. [1756])
Lamier hybride (Lamium hybridum Vill. [1786])
Lamier pourpre (Lamium purpureum L. [1753])
Ivraie multiflore (Lolium multiflorum Lam. [1779])
Ivraie vivace (Lolium perenne L. [1753])
Lotier corniculé (Lotus corniculatus L. [1753])
Mouron rouge (Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Luzerne tachetée (Medicago arabica (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (Medicago lupulina L. [1753])
Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Roche [1814])
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Oxalis dressé (Oxalis dillenii Jacq. [1794])
Piloselle (Pilosella officinarum Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])
Plantain majeur (Plantago major L. [1753])

Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
(*Sagina* L. [1753])
Orpin blanc (*Sedum album* L. [1753])
Orpin pourpier (*Sedum cepaea* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Laiteron rude (*Sonchus asper* (L.) Hill [1769])
Laiteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Torilis des champs (*Torilis arvensis* (Huds.) Link [1821])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Ortie dioïque (*Urtica dioica* L. [1753])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique petit chêne (*Veronica chamaedrys* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Véronique à feuilles de serpolet (*Veronica serpyllifolia* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Gui des feuillus (*Viscum album* L. [1753])

Espèces cultivées :

Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Erable japonais (*Acer palmatum* Thunb. [1784])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable rouge (*Acer rubrum* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Berbéri de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Camélia de noël (*Camellia sasanqua* Thunb. [1784])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Gainier commun (*Cercis siliquastrum* L. [1753])
Cyprès de Lawson (*Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray) Parl. [1866])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Cyprès d'Italie (*Cupressus sempervirens* L. [1753])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Gommier à cidre (*Eucalyptus gunnii* Hook.f. [1844])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Hibiscus (*Hibiscus syriacus* L. [1753])




Hortensia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. [1830])
Hortensia à feuilles de chêne (*Hydrangea quercifolia* W.Bartram [1791])
Buisson de beauté (*Kolkwitzia amabilis* Graebn. [1901])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Magnolia à grandes fleurs (*Magnolia grandiflora* L. [1759])
Magnolia à fleurs de Lis (*Magnolia liliiflora* Desr. [1792])
Mûrier noir (*Morus nigra* L. [1753])
Paulownia (*Paulownia tomentosa* (Thunb.) Steud. [1841])
Photinia Lindley (*Photinia Lindley* [1821])
Epicéa commun (*Picea abies* (L.) H.Karst. [1881])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L. [1753])
Pin pleureur de l'Himalaya (*Pinus wallichiana* A.B.Jacks. [1947])
Thuya d'Orient (*Platycladus orientalis* (L.) Franco [1949])
Peuplier noir d'Italie (*Populus nigra* var. *italica* Du Roi [1772])
Prunier myrobalan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Prunier domestique (*Prunus domestica* L. [1753])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Cerisier du Japon (*Prunus serrulata* Lindl. [1830])
Sapin de Douglas (*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco [1950])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Chêne pédonculé (*Quercus robur* L. [1753])
Chêne rouge d'Amérique (*Quercus rubra* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Sorbier des oiseleurs (*Sorbus aucuparia* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Tamaris à petites fleurs (*Tamarix parviflora* DC. [1828])
If à baies (*Taxus baccata* L. [1753])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop. [1771])

Si vous souhaitez connaitre l"ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021

Nombre d'espèces recensées : 112	Dont 82 sauvages	Dont 30 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Renoncule à petites fleurs 	(Ranunculus parviflorus L. [1758])	Espèce sauvage On la retrouve au bord des chemins, dans les champs ou les friches... C'est une plante qui est classée en danger d'extinction dans la région AURA.	
Trèfle rampant 	(Trifolium repens L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.	
Lierre grimpant 	(Hedera helix L. [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	
Brunelle commune 	(Prunella vulgaris L. [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Bugle genève (*Ajuga genevensis* L. [1753])
Andryale à feuilles entières (*Andryala integrifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Avoine barbue (*Avena barbata* Pott ex Link [1799])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Hypericum (*Hypericum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobaea vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])

Piloselle (*Pilosella officinarum* Vaill. [1754])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (*Poterium sanguisorba* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Rorippe des Pyrénées (*Rorippa pyrenaica* (All.) Rchb. [1838])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Sedum reflexum (*Sedum reflexum* L. [1755])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Laïteron rude (*Sonchus asper* (L.) Hill [1769])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Pissenlit gracile (*Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Hedge-parsleys (*Torilis* Adans. [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle champêtre (*Trifolium campestre* Schreb. [1804])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])

Espèces cultivées :

Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable sycomore (*Acer pseudoplatanus* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Catalpa (*Catalpa bignonioides* Walter [1788])
Céanothe (*Ceanothus impressus* Trel. [1888])
Noisetier (*Corylus avellana* L. [1753])
Cotonéaster horizontal (*Cotoneaster horizontalis* Decne. [1879])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Fusain de Fortune (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz. [1933])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Genévrier commun (*Juniperus communis* L. [1753])
Genévrier rampant (*Juniperus horizontalis* Moench)
Laurier-cerise (*Laurus nobilis* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum japonicum* Thunb. [1780])
Platane d'Espagne (*Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh. [1770])
Prunier myrobolan (*Prunus cerasifera* Ehrh. [1784])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
Chêne pubescent (*Quercus pubescens* Willd. [1805])
(*Rosa* L. [1753])

Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Sarriette annuelle (*Satureja hortensis* L. [1753])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Viorne obier (*Viburnum opulus* L. [1753])
Viorne tin (*Viburnum tinus* L. [1753])
Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 150	Dont 95 sauvages	Dont 55 cultivées
Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :		
Carotte sauvage (Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p><u>Source :</u> Arn</p>
Trèfle rampant (Trifolium repens L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles. Elle est très basse, à tige rampante, reconnaissable à ses fleurs blanches.</p>	 <p><u>Source :</u> Hans Hillewaert</p>
Lierre grimpant (Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p><u>Source :</u> Joan-T</p>
Brunelle commune (Prunella vulgaris L. [1753])	<p>Espèce sauvage</p> <p>C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.</p>	 <p><u>Source :</u> Ivar Leidus</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Bugle rampante (*Ajuga reptans* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Flouve odorante (*Anthoxanthum odoratum* L. [1753])
Armoise commune (*Artemisia vulgaris* L. [1753])
Avoine barbue (*Avena barbata* Pott ex Link [1799])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
(*Carex* L. [1753])
Centaurée jacée (*Centaurea jacea* L. [1753])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Chicorée amère (*Cichorium intybus* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Vipérine à feuilles de plantain (*Echium plantagineum* L. [1771])
(*Epilobium* L. [1753])
Vergerette annuelle (*Erigeron annuus* (L.) Desf. [1804])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Vesce hérissée (*Ervilia hirsuta* (L.) Opiz [1852])
Euphorbe petit-cyprés (*Euphorbia cyparissias* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fétuque rouge (*Festuca rubra* L. [1753])
Immortelle d'Allemagne (*Filago germanica* L. [1763])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Herbe à robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Houlque laineuse (*Holcus lanatus* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Séneçon jacobée (*Jacobaea vulgaris* Gaertn. [1791])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Gesse des prés (*Lathyrus pratensis* L. [1753])
Marguerite commune (*Leucanthemum vulgare* Lam. [1779])
Linaire commune (*Linaria vulgaris* Mill. [1768])
Lotier corniculé (*Lotus corniculatus* L. [1753])
Mauve musquée (*Malva moschata* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])

Mercuriale annuelle (Mercurialis annua L. [1753])
Muscari à grappes (Muscari neglectum Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (Myosotis ramosissima Rochel [1814])
Origan commun (Origanum vulgare L. [1753])
Oxalis corniculé (Oxalis corniculata L. [1753])
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata L. [1753])
Plantain majeur (Plantago major L. [1753])
Pâturin annuel (Poa annua L. [1753])
Pâturin des prés (Poa pratensis L. [1753])
Pâturin commun (Poa trivialis L. [1753])
Fraisier de Duchesne (Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille négligée (Potentilla neglecta Baumg. [1816])
Potentille dressée (Potentilla recta L. [1753])
Potentille rampante (Potentilla reptans L. [1753])
Pimprenelle à fruits réticulés (Poterium sanguisorba L. [1753])
Brunelle commune (Prunella vulgaris L. [1753])
Bouton d'Or (Ranunculus acris L. [1753])
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus L. [1753])
Ronce commune (Rubus fruticosus L. [1753])
Oseille des prés (Rumex acetosa L. [1753])
Petite oseille (Rumex acetosella L. [1753])
Saxifrage granulé (Saxifraga granulata L. [1753])
Saxifrage à trois doigts (Saxifraga tridactylites L. [1753])
Orpin de Bologne (Sedum sexangulare L. [1753])
Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens DC. [1838])
Séneçon commun (Senecio vulgaris L. [1753])
Rubéole des champs (Sherardia arvensis L. [1753])
Laïteron potager (Sonchus oleraceus L. [1753])
Pissenlit gracile (Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser [1821])
Pissenlit officinal (Taraxacum officinale F.H.Wigg. [1780])
Torilis des champs (Torilis arvensis (Huds.) Link [1821])
Trèfle douteux (Trifolium dubium Sibth. [1794])
Trèfle des prés (Trifolium pratense L. [1753])
Trèfle rampant (Trifolium repens L. [1753])
Ortie dioïque (Urtica dioica L. [1753])
Mache doucette (Valerianella locusta (L.) Laterr. [1821])
Molène blattaire (Verbascum blattaria L. [1753])
Verveine officinale (Verbena officinalis L. [1753])
Véronique des champs (Veronica arvensis L. [1753])
Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys L. [1753])
Véronique de Perse (Veronica persica Poir. [1808])
Poisette (Vicia sativa L. [1753])
Vesce velue (Vicia villosa Roth [1793])
Vulpie faux Brome (Vulpia bromoides (L.) Gray [1821])

Espèces cultivées :

Erable champêtre (Acer campestre L. [1753])
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus L. [1753])
Erable argenté (Acer saccharinum L. [1753])
Achillée millefeuille (Achillea millefolium L. [1753])
Ail commun (Allium sativum L. [1753])
Ail des ours (Allium ursinum L. [1753])
Verveine odorante (Aloysia citrodora Palau [1784])
Anémone couronnée (Anemone coronaria L. [1753])
Faux houx (Berberis aquifolium Pursh [1814])
Bougainvillée glabre (Bougainvillea glabra Choisy [1849])

Camélia de noël (*Camellia sasanqua* Thunb. [1784])
Caryopteris de Clandon (*Caryopteris x clandonensis* Hort. [1933])
Céanothe (*Ceanothus impressus* Trel. [1888])
Artichaut (*Cynara scolymus* L. [1753])
Œillet giroflée (*Dianthus caryophyllus* L. [1753])
Fougère mâle (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott [1834])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Marguerite du Transvaal (*Gerbera jamesonii* Bolus ex Adlam [1888])
Hortensia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. [1830])
Iris d'Allemagne (*Iris germanica* L. [1753])
Laitue cultivée (*Lactuca sativa* L. [1753])
Lilas des Indes (*Lagerstroemia indica* L. [1759])
Laurier-cerise (*Laurus nobilis* L. [1753])
Lavande papillon (*Lavandula multifida* L. [1753])
Troène du Japon (*Ligustrum japonicum* Thunb. [1780])
Lis orangé à bulbille (*Lilium bulbiferum* L. [1753])
Liquidambar (*Liquidambar styraciflua* L. [1753])
Pommier (*Malus* Mill. [1754])
Mandevilla splendens (Mandevilla splendens (Hook. f.) Woodson [1933])
(*Mentha* L. [1753])
Muscat à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Narcisse jonquille (*Narcissus jonquilla* L. [1753])
Laurier rose (*Nerium oleander* L. [1753])
Gaura de Lindheimer (*Oenothera lindheimeri* (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch [2007])
Olivier d'Europe (*Olea europaea* L. [1753])
Sauge d'Afghanistan (*Perovskia atriplicifolia* Benth)
Plystic à frondes soyeuses (*Polystichum setiferum* (Forssk.) T.Moore ex Woyn. [1913])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Cerisier des bois (*Prunus avium* (L.) L. [1755])
Prunier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb* L. [1753])
Rhubarbe (*Rheum x hybridum* Murray [1775])
Rhododendron maximun (*Rhododendron maximum* L. [1753])
Groseillier noir (*Ribes nigrum* L. [1753])
(*Rosa* L. [1753])
Romarin (*Rosmarinus officinalis* L. [1753])
Framboisier (*Rubus idaeus* L. [1753])
Sauge officinale (*Salvia officinalis* L. [1753])
Moutarde des champs (*Sinapis arvensis* L. [1753])
Morelle faux Jasmin (*Solanum laxum* Spreng. [1824])
Spirée du Japon (*Spiraea japonica* L.f. [1782])
Spirée (*Spiraea x billardii* Herincq [1857])
Thym commun (*Thymus vulgaris* L. [1753])
(*Tulipa* L. [1753])
Vesce Fève (*Vicia faba* L. [1753])
Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l’ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 114	Dont 94 sauvages	Dont 20 cultivées
--	----------------------------	-----------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Carotte sauvage	(Daucus carota L. [1753])	<p>Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.</p>	 <p><u>Source :</u> Arn</p>
Clématite des haies	(Clematis vitalba L. [1753])	<p>Espèce sauvage C'est une espèce qui nourrit de nombreux insectes et papillons comme le Thècle du Bouleau.</p>	 <p><u>Source :</u> J.F. Gaffard</p>
Lierre grimpant	(Hedera helix L. [1753])	<p>Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.</p>	 <p><u>Source :</u> Joan-T</p>
Mélisse officinale	(Melissa officinalis L. [1753])	<p>Espèce sauvage C'est une plante mellifère qui attire de nombreuses abeilles grâce à son nectar. Elle possède une odeur citronnée. Reine des infusions calmantes.</p>	 <p><u>Source :</u> Gideon Pisanty</p>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Ail maraîcher (*Allium oleraceum* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Amarante réfléchie (*Amaranthus retroflexus* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Brome mou (*Bromus hordeaceus* L. [1753])
Bryone dioïque (*Bryonia dioica* Jacq. [1774])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
(*Cerastium* L. [1753])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Clématite des haies (*Clematis vitalba* L. [1753])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Chiendent commun (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
(*Erigeron* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigue (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Ficaire printanière (*Ficaria verna* Huds. [1762])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Géranium à feuilles rondes (*Geranium rotundifolium* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])
Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier amplexicaule (*Lamium amplexicaule* L. [1753])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Passerage drave (*Lepidium draba* L. [1753])
Fétuque élevée (*Lolium arundinaceum* (Schreb.) Darbysh. [1993])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])

Mauve alcée (*Malva alcea* L. [1753])
Petite mauve (*Malva neglecta* Wallr. [1824])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Mélisse officinale (*Melissa officinalis* L. [1753])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Pricride éperviaire (*Picris hieracioides* L. [1753])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Plantain majeur (*Plantago major* L. [1753])
Plantain moyen (*Plantago media* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin bulbeux (*Poa bulbosa* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Coucou (*Primula veris* L. [1753])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Patience à feuilles obtuses (*Rumex obtusifolius* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])
Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verbascum (*Verbascum* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique à feuilles de lierre (*Veronica hederifolia* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
Poisette (*Vicia sativa* L. [1753])
(*Viola* L. [1753])
Violette des bois (*Viola reichenbachiana* Jord. ex Boreau [1857])

Espèces cultivées :

Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Berbéis de Thunberg (*Berberis thunbergii* DC. [1821])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Cèdre à encens (*Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin [1956])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Oranger du Mexique (*Choisya ternata* Kunth [1823])
Aubépine à un style (*Crataegus monogyna* Jacq. [1775])
Oléastre (*Elaeagnus x submacrophylla* Servett. [1908])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])

Houx (*Ilex aquifolium* L. [1753])
Parthenocissus Planch (Parthenocissus Planch. [1887])
Pin noir d'Autriche (*Pinus nigra* J.F.Arnold [1785])
Thuya d'Orient (*Platycladus orientalis* (L.) Franco [1949])
Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus* L. [1753])
Buisson ardent (*Pyracantha coccinea* M.Roem. [1847])
(*Rosa* L. [1753])
Spirée de Van Houtte (*Spiraea x vanhouttei* (Briot) Carrière [1876])
Thuya du Canada (*Thuja occidentalis* L. [1753])
Petit orme (*Ulmus minor* Mill. [1768])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>

Résultats de l'inventaire de Botanique – 2021



Nombre d'espèces recensées : 229	Dont 119 sauvages	Dont 110 cultivées
--	-----------------------------	------------------------------

Voici quelques exemples d'espèces présentes sur votre site :

Carotte sauvage (<i>Daucus carota L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante qui est une source de nectar pour les polliniseurs et de graines pour les oiseaux. Elle abrite aussi de nombreux autres insectes.	 <small>Source : Arn</small>
Renouée des oiseaux (<i>Polygonum aviculare L.</i> [1753])	Espèce sauvage Récoltée et vendue aux urbains au siècle dernier comme salade sauvage. Elle possède des graines très appréciées par les oiseaux. Elle se glisse partout en ville et est très résistante.	 <small>Source : Anneli Salo</small>
Lierre grimpant (<i>Hedera helix L.</i> [1753])	Espèce sauvage Un précieux allié pour la biodiversité : les oiseaux peuvent y nicher et les fruits du lierre sont parmi les premiers au printemps. Les insectes aiment s'y cacher et grâce à sa floraison tardive, de nombreux polliniseurs viennent s'y nourrir à l'automne. Grâce à ses racines propres, le lierre ne porte pas préjudice à l'arbre qui lui sert seulement de tuteur.	 <small>Source : Joan-T</small>
Brunelle commune (<i>Prunella vulgaris L.</i> [1753])	Espèce sauvage C'est une plante mellifère riche en nectar et en pollen utile aux abeilles sauvages.	 <small>Source : Ivar Leidus</small>

Liste complète des espèces de votre site :



Espèces sauvages :

Achillée millefeuille (*Achillea millefolium* L. [1753])
Aigremoine europatoire (*Agrimonia eupatoria* L. [1753])
Agrostide commune (*Agrostis capillaris* L. [1753])
Ail maraîcher (*Allium oleraceum* L. [1753])
Amarante couchée (*Amaranthus deflexus* L. [1771])
Amarante hybride (*Amaranthus hybridus* L. [1753])
Ambroisie annuelle (*Ambrosia artemisiifolia* L. [1753])
Brome stérile (*Anisantha sterilis* (L.) Nevski [1934])
Alchémille des champs (*Aphanes arvensis* L. [1753])
Arabette de thalius (*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh. [1842])
Pâquerette (*Bellis perennis* L. [1753])
Chou sauvage (*Brassica oleracea* L. [1753])
Capselle bourse-à-paster (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik. [1792])
Cardamine hérissée (*Cardamine hirsuta* L. [1753])
Laîche écartée (*Carex divulsa* Stokes [1787])
Pâturin rigide (*Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. [1953])
Céraiste commune (*Cerastium fontanum* Baumg. [1816])
Céraiste aggloméré (*Cerastium glomeratum* Thuill. [1799])
Grande chélidoine (*Chelidonium majus* L. [1753])
Chénopode blanc (*Chenopodium album* L. [1753])
Cirse commun (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten. [1838])
Calament glanduleux (*Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze [1891])
Liseron des champs (*Convolvulus arvensis* L. [1753])
Crépide bisannuelle (*Crepis biennis* L. [1753])
Crépide à feuilles de capselle (*Crepis bursifolia* L. [1753])
Crépide capillaire (*Crepis capillaris* (L.) Wallr. [1840])
Crépide de Nîmes (*Crepis sancta* (L.) Bornm. [1913])
Crépide hérissée (*Crepis setosa* Haller f. [1797])
Bleuet (*Cyanus segetum* Hill [1762])
Chiendent pied-de-poule (*Cynodon dactylon* (L.) Pers. [1805])
Dactyle aggloméré (*Dactylis glomerata* L. [1753])
Carotte sauvage (*Daucus carota* L. [1753])
Drave de printemps (*Draba verna* L. [1753])
Chiendent commun (*Elytrigia repens* (L.) Desv. ex Nevski [1934])
Conyze du Canada (*Erigeron canadensis* L. [1753])
Erodium à feuilles de cigne (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. [1789])
Euphorbe réveil matin (*Euphorbia helioscopia* L. [1753])
Euphorbe omblette (*Euphorbia peplus* L. [1753])
(*Festuca* L. [1753])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Fumeterre officinale (*Fumaria officinalis* L. [1753])
Gaillet gratteron (*Galium aparine* L. [1753])
Gaillet commun (*Galium mollugo* L. [1753])
Gaillet de Paris (*Galium parisiense* L. [1753])
Géranium découpé (*Geranium dissectum* L. [1755])
Géranium à feuilles molles (*Geranium molle* L. [1753])
Géranium fluet (*Geranium pusillum* L. [1759])
Herbe à robert (*Geranium robertianum* L. [1753])
Benoîte commune (*Geum urbanum* L. [1753])
Lierre terrestre (*Glechoma hederacea* L. [1753])
Lierre grimpant (*Hedera helix* L. [1753])

Orge sauvage (*Hordeum murinum* L. [1753])
Millepertuis perforé (*Hypericum perforatum* L. [1753])
Porcelle enracinée (*Hypochaeris radicata* L. [1753])
Laitue scariole (*Lactuca serriola* L. [1756])
Lamier hybride (*Lamium hybridum* Vill. [1786])
Lamier pourpre (*Lamium purpureum* L. [1753])
Passerage drave (*Lepidium draba* L. [1753])
Lobulaire maritime (*Lobularia maritima* (L.) Desv. [1815])
Ivraie vivace (*Lolium perenne* L. [1753])
Mouron rouge (*Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb. [2009])
Mauve sauvage (*Malva sylvestris* L. [1753])
Luzerne tachetée (*Medicago arabica* (L.) Huds. [1762])
Luzerne lupuline (*Medicago lupulina* L. [1753])
Luzerne cultivée (*Medicago sativa* L. [1753])
Mélique ciliée (*Melica ciliata* L. [1753])
Menthe à feuilles rondes (*Mentha suaveolens* Ehrh. [1792])
Mercuriale annuelle (*Mercurialis annua* L. [1753])
Muscari à grappes (*Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842])
Myosotis rameux (*Myosotis ramosissima* Rochel [1814])
Dame-d'onze-heures (*Ornithogalum divergens* Boreau [1857])
Oxalis corniculé (*Oxalis corniculata* L. [1753])
Oxalis dressé (*Oxalis dillenii* Jacq. [1794])
Plantain lancéolé (*Plantago lanceolata* L. [1753])
Pâturin annuel (*Poa annua* L. [1753])
Pâturin bulbeux (*Poa bulbosa* L. [1753])
Pâturin des prés (*Poa pratensis* L. [1753])
Pâturin commun (*Poa trivialis* L. [1753])
Polycarpon à quatre feuilles (*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. [1759])
Renouée des oiseaux (*Polygonum aviculare* L. [1753])
Pourpier cultivé (*Portulaca oleracea* L. [1753])
Fraisier de Duchesne (*Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf [1904])
Potentille négligée (*Potentilla neglecta* Baumg. [1816])
Potentille rampante (*Potentilla reptans* L. [1753])
Potentille printanière (*Potentilla verna* L. [1753])
Primevère acaule (*Primula vulgaris* Huds. [1762])
Brunelle laciniée (*Prunella laciniata* (L.) L. [1763])
Brunelle commune (*Prunella vulgaris* L. [1753])
Renoncule bulbeuse (*Ranunculus bulbosus* L. [1753])
Renoncule à petites fleurs (*Ranunculus parviflorus* L. [1758])
Renoncule rampante (*Ranunculus repens* L. [1753])
Réséda raiponce (*Reseda phytisma* L. [1753])
Ronce commune (*Rubus fruticosus* L. [1753])
Patience élégante (*Rumex pulcher* L. [1753])
Sauge des prés (*Salvia pratensis* L. [1753])
Sauge fausse-verveine (*Salvia verbenaca* L. [1753])
Poivre de muraille (*Sedum acre* L. [1753])
Séneçon sud-africain (*Senecio inaequidens* DC. [1838])
Séneçon commun (*Senecio vulgaris* L. [1753])
Millet des oiseaux (*Setaria italica* (L.) P.Beauv. [1812])
Rubéole des champs (*Sherardia arvensis* L. [1753])
Silènes à feuilles larges (*Silene latifolia* Poir. [1789])
Laïteron rude (*Sonchus asper* (L.) Hill [1769])
Laïteron potager (*Sonchus oleraceus* L. [1753])
Mouron des oiseaux (*Stellaria media* (L.) Vill. [1789])
Pissenlit officinal (*Taraxacum officinale* F.H.Wigg. [1780])
(*Thymus* L. [1753])
Hedge-parsleys (*Torilis Adans.* [1763])

Torilis à fleurs glomérulées (*Torilis nodosa* (L.) Gaertn. [1788])
Trèfle champêtre (*Trifolium campestre* Schreb. [1804])
Trèfle douteux (*Trifolium dubium* Sibth. [1794])
Trèfle des prés (*Trifolium pratense* L. [1753])
Trèfle rampant (*Trifolium repens* L. [1753])
Mache doucette (*Valerianella locusta* (L.) Laterr. [1821])
Verveine officinale (*Verbena officinalis* L. [1753])
Véronique des champs (*Veronica arvensis* L. [1753])
Véronique de Perse (*Veronica persica* Poir. [1808])
(*Viola* L. [1753])
Violette de rivin (*Viola riviniana* Rchb. [1823])

Espèces cultivées :

Erable negundo (*Acer negundo* L. [1753])
Erable plane (*Acer platanoides* L. [1753])
Erable argenté (*Acer saccharinum* L. [1753])
Marronnier d'Inde (*Aesculus hippocastanum* L. [1753])
Ciboulette (*Allium schoenoprasum* L. [1753])
Aloé vera (*Aloe vera* (L.) Burm.f. [1768])
Clochette (*Aquilegia vulgaris* L. [1753])
Arbousier commun (*Arbutus unedo* L. [1753])
Marguerite de Paris (*Argyranthemum frutescens* (L.) Sch.Bip. [1844])
Armoise absinthe (*Artemisia absinthium* L. [1753])
Aubriétie deltoïde (*Aubrieta deltoidea* (L.) DC. [1821])
Faux houx (*Berberis aquifolium* Pursh [1814])
Bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth [1788])
Callune (*Calluna vulgaris* (L.) Hull [1808])
Charme (*Carpinus betulus* L. [1753])
Cèdre de l'Atlas (*Cedrus atlantica* (Manetti ex Endl.) Carrière [1855])
Micocoulier de provence (*Celtis australis* L. [1753])
Centranthe rouge (*Centranthus ruber* (L.) DC. [1805])
Chlorophytum comosum (*Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques [1862])
Muguet (*Convallaria majalis* L. [1753])
Herbe de la Pampa (*Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. [1900])
Coudrier de Lambert (*Corylus maxima* Mill. [1768])
Arbre à perruque (*Cotinus coggygria* Scop. [1771])
Late cotoneaster (*Cotoneaster coriaceus* Franch. [1890])
Cyprès de l'Arizona (*Cupressus arizonica* Greene [1882])
Centaurée de Trionfetti (*Cyanus triumfettii* (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve [1961])
(*Cyclamen* L. [1753])
Délosperma (*Delosperma cooperi* (Hook.f.) L.Bolus [1927])
Œillet giroflée (*Dianthus caryophyllus* L. [1753])
Eriobotrie du Japon (*Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. [1821])
Giroflée des murailles (*Erysimum cheiri* (L.) Crantz [1769])
Euphorbe des vallons (*Euphorbia characias* L. [1753])
Hêtre commun (*Fagus sylvatica* L. [1753])
Fétuque glauque (*Festuca glauca* Vill. [1787])
Figuier commun (*Ficus carica* L. [1753])
Forsytia Vahl (*Forsythia Vahl* [1804])
Fraisier sauvage (*Fragaria vesca* L. [1753])
Frêne commun (*Fraxinus excelsior* L. [1753])
Freesia (*Freesia refracta* (Jacq.) Eckl. ex Klatt [1866])
Géranium sanguin (*Geranium sanguineum* L. [1753])
Marguerite du Transvaal (*Gerbera jamesonii* Bolus ex Adlam [1888])
Ginkgo (*Ginkgo biloba* L. [1771])
Helleborus (*Helleborus* L. [1753])

Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva (L.) L. [1762])
Hibiscus (Hibiscus syriacus L. [1753])
Hortensia (Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. [1830])
Orpin reprise (Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba [1977])
Iris d'Allemagne (Iris germanica L. [1753])
Jasmin à fleurs nues (Jasminum nudiflorum Lindl. [1846])
Kalanchoé de Blossfeld (Kalanchoe blossfeldiana Poelln. [1934])
Arbre aux lanternes (Koelreuteria paniculata Laxm. [1772])
Lilas des Indes (Lagerstroemia indica L. [1759])
Troène du Japon (Ligustrum ovalifolium Hassk. [1844])
Liquidambar (Liquidambar styraciflua L. [1753])
(Mentha L. [1753])
Mûrier noir (Morus nigra L. [1753])
Muscari à grappes (Muscari neglectum Guss. ex Ten. [1842])
Bambou sacré (Nandina domestica)
Jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus L. [1753])
Herbe aux chats (Nepeta cataria L. [1753])
Laurier rose (Nerium oleander L. [1753])
Nigelle de Damas (Nigella damascena L. [1753])
Olivier d'Europe (Olea europaea L. [1753])
Oxalis articulé (Oxalis articulata Savigny [1798])
Astérolide maritime (Pallenis maritima (L.) Greuter [1997])
Géranium à feuilles zonées (Pelargonium L'Hér. [1789])
Sauge d'Afghanistan (Perovskia atriplicifolia Benth)
Persil cultivé (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill [1925])
Seringa commun (Philadelphus coronarius L. [1753])
Photinia Lindley (Photinia Lindley [1821])
Épicéa commun (Picea abies (L.) H.Karst. [1881])
Pin noir d'Autriche (Pinus nigra J.F.Arnold [1785])
Pin sylvestre (Pinus sylvestris L. [1753])
Pin pleureur de l'Himalaya (Pinus wallichiana A.B.Jacks. [1947])
Platane d'Espagne (Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. [1770])
Peuplier noir d'Italie (Populus nigra var. italicica Du Roi [1772])
Abricotier commun (Prunus armeniaca L. [1753])
Prunier myrobalan (Prunus cerasifera Ehrh. [1784])
Amandier du Japon (Prunus glandulosa)
Laurier-cerise (Prunus laurocerasus L. [1753])
Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco [1950])
Grenadier commun (Punica granatum L. [1753])
Buisson ardent (Pyracantha coccinea M.Roem. [1847])
Radis cultivé (Raphanus sativus L. [1753])
Rhododendron indicum (Rhododendron indicum Sweet [1830])
(Rosa L. [1753])
Romarin (Rosmarinus officinalis L. [1753])
(Sedum L.)
Orpin de Palmer (Sedum palmeri S.Watson [1882])
Joubarbe des toits (Sempervivum tectorum L. [1753])
Arbre de miel (Sophora japonica L. [1767])
Spirée blanche (Spiraea alba Du Roi [1772])
Spirée de Van Houtte (Spiraea x vanhouttei (Briot) Carrière [1876])
Stipe penné (Stipa pennata L. [1753])
Symphorine à baies-de-corail (Symphoricarpos orbiculatus Moench [1794])
Lilas commun (Syringa vulgaris L. [1753])
Œillet d'Inde (Tagetes patula L. [1753])
Tamaris à petites fleurs (Tamarix parviflora DC. [1828])
Thym commun (Thymus vulgaris L. [1753])
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos Scop. [1771])

Palmier de Chusan (*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. [1862])

(*Tulipa* L. [1753])

Verveine (*Verbena bonariensis* L. [1753])

Viorne mancienne (*Viburnum lantana* L. [1753])

Vesce Fève (*Vicia faba* L. [1753])

Petite pervenche (*Vinca minor* L. [1753])

Pensée sauvage (*Viola tricolor* L. [1753])

Vigne cultivée (*Vitis vinifera* L. [1753])

Glycine de Chine (*Wisteria sinensis* (Sims) Sweet [1826])

Yucca gloriosa (*Yucca gloriosa* L. [1753])

Si vous souhaitez connaitre l'ensemble des résultats de notre étude de botanique sur les 48 sites, rendez-vous sur notre site internet : <https://collectifs-biodiversite.universite-lyon.fr/>